



رياضيات الأعمال


الوحدة الأولى

المصفوفات

شاملة لجميع الأسئلة (كتاب الطّالب وكتاب التّمارين)

الشّرح كاملاً على بطاقة منصّة ادرس جو

إعداد الأستاذ أ. أحمد إبراهيم المصري



	الصف الثاني ثانوي أكاديمي – رياضيات الأعمال				
	0788897	المصري 923	إعداد المعلم: أحمد ابراهيم		
CmJai					
			الوحدة الأولى: المصفوفات		
			للطائب		
			 -		
	1				

مثال 3

أحدُّد رتبة كل مصفوفة ممَّا يأتى:



- $\begin{bmatrix} 2 & 5 & -4 \\ 1 & 7 & 3 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix}$
- **04** [10]
- $\begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$

- استعمل المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ الإجابة عن الأسئلة
 - o1) ما رتبة المصفوفة A ؟
 - a_{12} والعنصر a_{32} ما قيمة كلً من العنصر a_{32}

مثال 2

$$B = \left[egin{array}{cccc} 3 & 2 & 0 & 4 \ -1 & 1 & -3 & -5 \end{array}
ight]$$
استعمل المصفوفة: للإجابة عن الأسئلة الآتية:

- o1) ما رتبة المصفوفة B ؟
- b_{13} ما قيمة كلً من العنصر b_{24} والعنصر،
 - -3 أين يقع العنصر الذي قيمته -3

مثال 4

اذا كانت:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 7 & 4 \\ 6 & 8 & 0 \\ 5 & -6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 9 & 8 \\ 7 & -3 & 5 & 12 \end{bmatrix}$$
اڏا ڪانت:

$$a_{31}$$

01 أحدد موقع العنصر الذي قيمته 8 في المصفوفة.

02 أحدد موقع العنصر الذي قيمته 4 في المصفوفة.

أحدد موقع العنصر الذي قيمته 5 في المصفوفة.

أحدد موقع العنصر الذي قيمته -1 في المصفوفة.

مصفوفة صف: تكون من صف واحد وعدد من الأعمدة

أنواع خاصة من المصفوفات

$$C = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 7 & -3 \\ 6 & 4 & 0 \\ 12 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

المصفوفتان المتساويتان: لهما نفس الرتبة والعناصر المتناظرة مساوية.

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & x+1 \\ 3y+10 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ y & 1 \end{bmatrix}$$
: اذا کانت:

y و x فأجد قيمة كل من

مثال 6
$$F = \begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{08} \\ A \\ \mathbf{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3x-2 & 8 \\ 2 & 2x+4y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ 2 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



0788897923

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

 $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 4 & z & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & x + 2y & 4 \\ 3x - 11 & 2 & 1 \end{bmatrix}$



x, y, zفأجد قيمة كل من

تنظيم البيانات في المصفوفات وتحليلها

مثال 7

الطو ل الكتلة العمر الصف الدراسي (kg) (cm) (year) 135 10 5 155 50 14 12 145

يُبيِّن الجدول لجاور الأطوال والكتل الأعمار والصفوف لدراسية للشقيقات

الثلاث هديل وهبه ولانا في إحدى المدارس:

ران أرتب هذه البيانات في مصفوفة رتبتها 3×4 ، بحيث يُمثّل الطول والكتلة والعمر والصف الدراسي صفوف المصفوفة.

02 أجد مجموع عناصر الصف الأوّل، ثمّ أبيّن ما يُمثّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى)

03 أجد مجموع عناصر الصف الرابع، ثمَّ أبيّن ما يُمثّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى)

04 في المنافع العسابي لعناصر الصف الثاني يُقدَّم بيانات ذات معنى؛ أبرَر إجابتي.

$$\begin{bmatrix} 9 & x^2 \\ 2 - y & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 2x + 3 \\ -5 & 10 \end{bmatrix}$$
نا النا کانت:

y و x فجد قيمة كل من



0788897923

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

مثال 8

سياحة: يُبيِّن الجدول
المجاور نتائج استطلاع
آراءِ عيِّنات من سُكّان
ثلاث قرى متجاورة

مُحايِد مُعارِض مُؤيِّد A القرية B00 130 70 B القرية B40 250 40 C القرية B1300 700 200

بخصوص مشروع سياحي يُراد إقامته في موقع يتوسُّط هذه القرى:

- وم البيانات في مصفوفة صفوفها القرى؛ على أنْ يكون عدد الْمُؤيِّدين مُرتبًا ترتيبًا تصاعديًّا.
- ⁰²أجد مجموع عناصر الصف الأوّل، ثمّ أبيّن ما يُمثّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى)
 - (مَّ أَجِدُ مجموع عناصر العمود الثاني، ثمَّ أبيّن ما يُمثّله هذا الجموع (إنْ كان له معنى)
 - في المعاد الوسط الحسابي لعناصر العمود الثاني يُقدِّم بيانات ذات معنى؟ أبرَر إجابتي.

مثال 9

	المباريات	التسديدات	الأهداف
سمير	8	15	7
أحمد	11	25	13
فوّاز	14	20	9

يُبيِّن الجدول المجاور إنجازات ثلاثة من لاعبي كرة القدم في مباريات

دوري الصفوف في إحدى المدارس:

- انظّم هذه البيانات في المصفوفة S ، بحيث تحوي صفوفها إنجازات اللاعبين الثلاثة، ويُرتب فيها عدد الأهداف تنازليًا، ثمَّ أجد قيمة العنصر S_{32}
- 02 أجد مجموع عناصر الصف الثاني، ثمّ أبيّن ما يُمثّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى)
 - (إنْ كان له معنى)

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 788897923

مثال 10

كهربائيات: تتوزَّع 3 مستودعات لإحدى وكالات تجارة الأجهزة الكهربائية في 3 مدن. يوجد في مستودع المدينة الأولى 200 ثلاجة، و380 غسّالة، و250 شاشة، و300 مروحة، ويوجد في مستودع المدينة الثانية 160 ثلاجة، و280 غسّالة، و290 مروحة، ويوجد في مستودع المدينة الثالثة 120 ثلاجة، و280 غسّالة، و400 مروحة:

- ⁰¹ أنظَم هذه البيانات في مصفوفة ثمثّل أعمدتها أنواع الأجهزة الكهربائية، ثمّ أحدُد رتبة المصفوفة الناتجة.
- 02 أجمع عناصر كل صف، ثمَّ أبيّن ما يُمثّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى)
- 03 أجمع عناصر كل عمود، ثمَّ أبيّن ما يُمثّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى)

مثال 11

سُئِلت الأَسَر في مدينتين عن مصدر التدفئة الذي تستعمله في فصل الشتاء، ثمَّ سُجِّلت النتائج في الجدول المجاور الذي يُبيِّن عدد الأَسَر التي تستعمل كل مصدر. كيف يُمكِن عرض بيانات الجدول بصورة أخرى مُختصرة؟

	الغاز	الكهرباء	الكاز	أُخرى
المدينة A	3256	1678	4589	1253
Bالمدينة	4560	978	5874	2564



0788897923

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى

مهارات التفكير العليا

مثال 12

المالم تبريا

أبيِّن إذا كانت العبارة الآتية صحيحة دائمًا، أو صحيحة أحيانًا، أو غير صحيحة أبدًا، ثمَّ أبرًر إجابتي.

A=B إذا كان للمصفوفة A والمصفوفة B العدد نفسه من العناصر ، فإنَّ

مثال 14 توري

إذا كان عدد عناصر المصفوفة B عددًا أَوْلِيًّا، فماذا يُمكِن أَنْ تكون رتبتها؟ أَبرُر إجابتي.

مثال 15

إذا كانت المسافة بين إربد وعمّان 88~km ، والمسافة بين عمّان والعقبة 324~km ، والمسافة بين إربد والعقبة 408~km ، فأنشئ مصفوفة رتبتها 3×3 لتمثيل المسافات بين المدن الثلاث، ثمّ أبرر إجابتي.

مثال 13 مثالة مفتدح

أنشِئ مصفوفة مُربَعة من الرتبة 3 وأسمَيها A ، بحيث يكون

i , j من ، $a_{ij}=a_{ji}$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923

مثال 17 تعد:

اجد قیمهٔ کل من x, y, z اذا کانت:

$$\begin{bmatrix} x+2y & x-y \\ x+y+3z & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 7 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}$$

مثال 16 تعد:

$$i\in\{1,2,3\}$$
 اکتب المصفوفة b ، حيث: $b=2i-j$ لکل اکتب المصفوفة

$$j \in \{1,2,3,4\}$$
 ولكل

الدرس الثاني: العمليات على المصفوفات

يُمكِن جمع مصفوفتين أو طرحهما إذا وفقط إذا كانت لهما الرتبة نفسها ، وذلك بجمع العناصر المُتناظِرة في المصفوفتين في حالة الجمع ، وطرح هذه العناصر في حالة الطرح.

مثال 1

إذا كان:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -1 & -5 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 0 \\ -7 & 6 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 7 & 6 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \\ -9 & 1 \end{bmatrix}$$

جد کل مما یأتی (إن أمكن)

$$\bigcirc A + C$$

$$\bigcirc A + B$$

$$\bigcirc$$
 $B-D$

$$O(C + D)$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

مثال 3

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 7 & -2 & 1 \\ 8 & 10 & 6 \end{bmatrix}$$
، فأجد كل مما يأتي:

$$\binom{02}{-2D}$$

ضرب المصفوفة في عدد ثابت

عند ضرب المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فأجد كل مما يأتي: $D = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 7 & -2 & 1 \\ 8 & 10 & 6 \end{bmatrix}$ فأجد كل مما يأتي: في هذا العدد الثابت. $D = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 7 & -2 & 1 \\ 8 & 10 & 6 \end{bmatrix}$ عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت ، فإنَّ ذلك يعني ضرب كل عنصر من عناصر من عناصر المصفوفة في عدد ثابت عن من عناصر من عناص

$$5C$$
 اذا كان: $C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$ فأجد



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى

خصائص العمليات على المصفوفات

مثال 5 إذا كان:

$$E = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 6 & -4 & 9 \end{bmatrix}$$

فأجد كل مما يأتي (إن أمكن):

$$4E-3F$$

$$2G + 6F$$

$$03 5(G+H)$$

خصائص العمليات على المصفوفات

مفهوم أساسي

إذا كان A, B, C ثلاث مصفوفات لها الرتبة نفسها، وكان k, h عددين حقيقيين، فإنَّ:

1.
$$A + B = B + A$$

$$(A+B)+C=A+(B+$$

2. (A + B) + C = A + (B + C) Let A + B = A + (B + C)

3.
$$k(A + B) = kA + kB$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$
 , $B = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -8 & 1 \end{bmatrix}$
 فأحد $3A + 2B - 5C$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 3788897923

مثال 6

لدى إحدى الشركات التجارية فرعان في مدينة عمّان، وفرعان آخران في مدينة اربد. إذا مثلت المصفوفة A والمصفوفة B مُعدَّل المبيعات والأرباح اليومية من ا الأدوات الكهربائية (بمئات الدنانير) في كلِّ من فرعي هاتين المدينتين على الترتيب، فأجد المصفوفة $\, C \,$ ، التي ثمثًل مُعدًل المبيعات والأرباح الشهرية لفروع $\,$ الشركة في المدينتين معًا.

الأرباح المبيعات الأرباح المبيعات الأرباح المبيعات
$$A = \left[\begin{array}{ccc} 56 & 4 \\ 45 & 3.5 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 1 \\ 66 & 9 & 2 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

مثال 7

يملك كلِّ من راشد وحمد مزرعة في الأغوار، ومزرعة أخرى في المفرق. إذا مثلت المصفوفة A مُعدَّل الإنتاج اليومي (بالكيلوغرام) لمزرعتيهما في الأغوار من البندورة والباذنجان والفلفل، ومثلت المصفوفة B مُعدَّل الإنتاج اليومي لزرعتيهما في المفرق من الأصناف نفسها، فأجد المصفوفة $\,C\,$ التى ثمثّل مُعدّل $\,$ الإنتاج الأسبوعي (بالكيلوغرام) لمزرعتي راشد وحمد في الموقعين معًا.

	بندورة	باذنجان	فلفل		بندورة	باذنجان	فلفل	
4_[200	500	100	راشد , $B = \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}$	130	100	300	راشد
A -	260	430	245	حمد ، ۵ –	240	300	175	حمد

أتدرَّب وأحُلُّ المسائل

مسائل

جد ناتج كلِّ ممّا يأتي (إنْ أمكن).

$$\begin{array}{c|c}
1 & 7 & -3 \\
4 & 6 \\
10 & 0
\end{array} + \begin{bmatrix}
-4 & 8 \\
5 & 0 \\
4 & -5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 25 & 10 & 13 \\ 0 & 7 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -31 & 26 & -9 \\ 7 & 2 & 12 \end{bmatrix}$$

 $\begin{bmatrix}
12 & -3 \\
22 & 7
\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}
-6 & -5 \\
9 & 2
\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 8 \\ 9 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 8 & -2 \\ 5 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc}
7 & 3 & 9 & -2 \\
4 & 1 \\
6 & -3
\end{array}$$



$$9 - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 12 & -32 \\ 9 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc}
10 & 2 \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

 $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -9 \end{bmatrix}$ إذا كان:

- 4A + 3B
- $\frac{14}{2}C 3A$

15 B + 1.5B

16 3B + 2C

 $\frac{17}{2A} - C$

 $\frac{18}{4A} + 3C$

- وياضة: لدى مَحَلِّ تجهيزات رياضية فرع في مدينة الكرك، وفرع آخر في مدينة الطفيلة. إذا مثَّلت المصفوفة A عدد البدلات الرياضية التي باعها الفرعان من جميع المقاسات (صغيرة، مُتوسِّطة، كبيرة) في شهر نيسان عام 2024 م، ومثَّلت المصفوفة B عدد البدلات التي باعها الفرعان من المقاسات الثلاثة في شهر نيسان عام 2023 م، فأجد المصفوفة التي تُمثُّل ما باعه كلُّ من الفرعين في الشهرين معًا.

الصف الثاني ثانوي أكاديمي – رياضيات الأعمال

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى

مدارس: يُبيِّن الجدول المجاور محتويات مختبري الحاسوب في إحدى المدارس عام 2024 م. تُخطِّط إدارة المدرسة لزيادة هذه المحته بات بما

نسبته %40 . أكتب مصفوفة تُمثِّل ما يجب شراؤه للمختبرين، ومصفوفة أخرى تُمثِّل محتويات المختبرين بعد عملية الشراء.

	أجهزة حاسوب	طاولات	مقاعد
المختبر A	15	20	30
المختبر B	20	25	40

و التي تُحقِّق المعادلة الآتية:	أجد قيمة كلِّ من x ، و y ،
---------------------------------	--------------------------------

$$2\begin{bmatrix} x & 3 \\ 6 & y \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} x & 6 \\ z & -2 \end{bmatrix} - 4\begin{bmatrix} z & 3 \\ 0 & x \end{bmatrix}$$



إعداد المعلم: أحمد أبراهيم المصري (788897923

22

مهارات التفكير العليا



23 تبرير: أحدُد إذا كانت العبارة الآتية صحيحة أحيانًا، أو صحيحة دائمًا، أو غير صحيحة أبدًا، ثمَّ أبرًر إجابتي:

A+B إذا كان عدد عناصر المصفوفة A مُساوِيًا لعدد عناصر المصفوفة B، فإنَّه يُمكِن إيجاد

 $A = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.75 \\ 0.6 & 1 \\ 1.5 & 2.5 \end{bmatrix}$ أسعار البيع (بالدينار) لثلاثة

مشروبات (شاي، قهوة، عصير) بأكواب صغيرة وأُخرى كبيرة في أحد الأكشاك. وقد قرَّر صاحب الكشك رفع الأسعار بما نسبته %20؛ نظرًا إلى زيادة التكاليف. ما المصفوفة التي تُمثِّل الأسعار الجديدة؟

24 أكتشف الخطأ: ما الخطأ في الحلِّ الآتي:

$$\left[\begin{array}{ccc} 2 & 8 \\ 4 & 7 \end{array}\right] + \left[\begin{array}{cccc} 6 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cccc} 8 & 11 & 0 \\ 8 & 8 & 9 \end{array}\right]$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

رية منتوحة:
$$X-2Y=\begin{bmatrix}1&5\\-2&9\end{bmatrix}, 3X+4Y=\begin{bmatrix}8&5\\-31&12\end{bmatrix}$$
 $3A+2B=\begin{bmatrix}12&8&10\\6&-5&11\end{bmatrix}$ $3A+2B=\begin{bmatrix}12&8&10\\6&-5&11\end{bmatrix}$ أكتب المصفوفتين A , B بحيث يكون: A

$$3A + 2B = \begin{bmatrix} 12 & 8 & 10 \\ 6 & -5 & 11 \end{bmatrix}$$
 أكتب المصفو فتين A, B بحيث يكون:

0788897923


إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

ضرب المصفوفات

يُمكِن ضرب مصفوفتين إذا وفقط إذا كان عدد أعمدة المصفوفة الأولى مُساويًا لعدد صفوف المصفوفة الثانية.

B وعند ضرب المصفوفة A التي رتبتها m imes n في المصفوفة التي رتبتها n imes r

m imes r هي A imes B فإنّ رتبة الصفوفة الناتجة



مثال 1

إذا كانت $C_{3 imes 2}$ وكانت $B_{2 imes 2}$ ، وكانت $A_{2 imes 3}$ فأبيّن إذا كانت عملية الضرب في كلّ ممّا يأتي مُمكِنة أم لا.

وإنْ كانت كذلك، أحدُد رتبة مصفوفة الضرب الناتجة

1 AB

2 AC

مثال 2

اذا كانت $C_{2 imes 3}$ وكانت $B_{3 imes 2}$ ، وكانت $A_{2 imes 2}$ فأبيّن إذا كانت عملية الضرب في كلّ ممّا يأتي مُمكنة أم لا.

وإنْ كانت كذلك، أحدُد رتبة مصفوفة الضرب الناتجة

OI AB

02 BC

O3 CA

ضرب المصفوفات

$$.MN$$
 . فأجد: $N = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$. وكان: $M = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$. فأجد

تختلف عملية ضرب مصفوفتين عن عمليتي جمعهما وطرحهما إذ لا تُضرَب العناصر الْمُتناظِرة في بعضها كما في عمليتي جمع المصفوفات وطرحها

$$AB:$$
إذا كان: $AB: AB:$ $AB:$ $AB:$

مثال 5

$$.CD$$
 : وكان: $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$. وكان: $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$. فأجد:

أُفكِّر



0788897923

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

مثال 6 شطرنج:

تنافست ثلاث فرق في البطولة النهائية لنادي الشطرنج، وقد دُوَن عدد مَرَات الفوز والتعادل لهذه الفِرَق في الجدول المجاور. إذا علمت أنَّ فوز الفريق في المباراة الواحدة يعني حصوله على 3 نقاط، وأنَّ تعادله يعني حصوله على نقطة واحدة، فأستعمل المصفوفات في إيجاد عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق لتحديد الفريق الفائز.

الفريق	ربح	تعادل
A	5	4
В	6	3
С	4	5

مثال 7 كرة قدم:

يُبيَن الجدول المجاور نتائج 3 فرِق لكرة القدم بعدما لعب كلً منها 4 مباريات. إذا علمْتُ أنَّ فوز الفريق في المباراة الواحدة يعني حصوله على نقطة حصوله على نقطة واحدة، وأنَّ خسارته تعني عدم حصوله على أيَّ نقاط، فأستعمل المصفوفات في إيجاد عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق لتحديد الفريق الفائز.

الفريق	ربح	تعادل	خسارة
A	1	0	3
В	3	1	0
С	1	1	2



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

خصائص ضرب المصفوفات

يُحقّق ضرب المصفوفات بعض خصائص ضرب الأعداد الحقيقية. وفي ما يأتي بعض خصائص الضرب التي تتحقّق في المصفوفات.

خصائص ضرب المصفوفات

مفهوم أساسي

ثُعَــدُّ الخصائص الآتية صحيحة لأيِّ ثلاث مصفوفــات: R,S,T، وأيِّ عدد حقيقي cشرط أنْ تكون عمليتا الجمع والضرب مُعرَّ فتين في جميع الحالات الآتية:

1.
$$(RS)T = R(ST)$$

$$c(RS) - (cR)S - R(cT)$$

2.
$$c(RS) = (cR)S = R(cT)$$
 خاصية التجميع لضرب المصفوفات في عدد حقيقي

$$R(S+T) = RS + RT$$

3.
$$R(S+T) = RS + RT$$
 خاصية توزيع ضرب المصفوفات على جمعها من اليسار

4.
$$(R + S)T = RT + ST$$

4.
$$(R+S)T = RT + ST$$
 خاصية توزيع ضرب المصفوفات على جمعها من اليمين

الخاصية التبديلية لا تتحقَّق في ضرب المصفوفات؛ أَىٰ إِنَّ: $BA \neq AB$ حيث

أتعلَّم

A و B مصفو فتان. بالرغم من ذلك، فقد توجد حالات خاصة لمصفو فتين A و B تكون .AB = BA فيها

إذا كان:
$$R=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$
, $Q=\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $R=\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$: وكان: $R=\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ وممّا يأتي:

$$P(Q+R)$$

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923

مثال 9

إذا كان:
$$H=\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$
, $G=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $H=\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ إذا كان: $G=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

ممّا يأتي:

a)
$$(F+G)H$$

c)
$$G(mH)$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى

🦯 أتدرَّب وأحُلُّ المسائل



يذا كان:
$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0.5 & 3 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & -1.5 & -1 \\ 0.5 & 0 & 2 \\ 1.5 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$
 يذا كان:

عملية الضرب في كلِّ ممّا يأتي مُمكِنة أم لا. وإنْ كانت كذلك، أُحدِّد رتبة مصفوفة الضرب الناتجة:

- 1 AB
- \bigcirc BC

 \bigcirc DC

 \bullet BA

BCD

وكانت رتبة المصفوفة A هي: 3 imes 4 ، ورتبة المصفوفة C هي: 3 imes 4 ، فما رتبة المصفوفة B? إذا كانA = C ، وكانت رتبة المصفوفة A هي: A imes 4 ، ورتبة المصفوفة A

أجد ناتج كلِّ ممّا يأتي (إنْ أمكن)

$$\begin{bmatrix}
3 & -2 \\
2 & 4
\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}
2 & 3 \\
-1 & 5 \\
0 & 2
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
3 \\
-4 \\
1
\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
3 & -1 & 2 \\
4 & 2 & 0
\end{bmatrix} \times
\begin{bmatrix}
0 & 3 & 2 \\
-2 & 1 & 5 \\
4 & 7 & 2
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 8 & 10 & -7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
-2 & -1 \\
9 & -5 \\
3 & -1
\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}
-5 & 6 & -4 \\
0 & 6 & -3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
2 & 4 \\
0 & 3
\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}
8 & -14 \\
-4 & 7
\end{bmatrix}$$

	الطراز X	الطراز XD	الطراز R
المدينة A	12	10	0
Bالمدينة	4	4	20
المدينة C	8	9	12

20 صناعة سيّارات: تتوزَّع 3 مصانع لإحدى شركات صناعة السيّارات في 3 مدن، ويُبيِّن الجدول المجاور عدد ما يُنتِجه كل مصنع يوميًّا من 3 طرازات للسيّارات. إذا كان ربح الشركة في كل سيّارة من الطراز X هو JD1000، ومن

الطراز XD هو JD 2000، ومن الطراز R هو JD 1500، فأستعمل ضرب المصفوفات في إيجاد ربح كل مصنع يوميًّا من جميع طرازات السيّارات (بافتراض أنَّ جميع السيّارات المُنتَجة مَبيعة).



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (3897923

AB = AC : فَأُبِيِّنَ أَنَّ $A = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$: فان:

$$P = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 9 & -5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$
 إذا كان: $P = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$, وكان: $P = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$

- (QR)P
- $23 \quad n(PQ)$
- R(PQ)
- (nR)P



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

- x, y بدلالة AB 26
- .x, y بدلالة BA
- AB = BA أصغر قيمة صحيحة موجبة لكلًّ من x، و y التي تجعل AB = BA



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 7788897923

29 مُكسِّرات: يُعبِّع مَحْمص خليطًا من المُكسِّرات والفواكه المُجفَّفة في نوعين من الأكياس كما في الجدول الأيسر، ويُبيِّن الجدول الأيمن عدد وحدات البروتين والكربوهيدرات والدهون في الغرام الواحد من المُكسِّرات والفواكه المُجفَّفة. أستعمل ضرب المصفوفات لإيجاد عدد وحدات البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل نوع.

	مُكسِّرات (g)	فواكه مُجفَّفة (g)
الكيس 1	150	150
الكيس 2	200	100

	بروتين	كربوهيدرات	دهون
مُكسِّرات	20	21	52
فواكه مُجفَّفة	3	65	1

حجم الكوب	كبير	مُتوسِّط	صغير
عبر شبكة الإنترنت	5	4	2
من المتجر	3	5	9

دوَّنت سلمى في الجدول المجاور عدد ما باعته في متجرها من أكواب حافظة للحرارة مُتعدِّدة الحجوم (كبيرة، مُتوسِّطة، صغيرة) في أحد الأيام. كذلك دوَّنت طريقة بيع هذه الأكواب؛

وهي إمّا مباشرة من المتجر، وإمّا عبر شبكة الإنترنت. إذا كان سعر الكوب الكبير 4.5 JD، وسعر الكوب المُتوسِّط JD، وسعر الكوب المعفوفات المُتوسِّط JD، وسعر الكوب الصغير 3.5 JD، فكيف يُمكِن استعمال ضرب المصفوفات الإيجاد المبلغ الذي حصلت عليه سلمى من بيع الأكواب بكلتا طريقتي البيع؟



$$C = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 12 \\ -2 & 3 & 4 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 8 & 4 \\ 1 & -2 & -6 \\ 11 & 3 & 5 \end{bmatrix} : \text{ landbe decision}$$

$$C = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 12 \\ 1 & -2 & -6 \\ 11 & 3 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 8 & 4 \\ 1 & -2 & -6 \\ 11 & 3 & 5 \end{bmatrix} : \text{ landbe decision}$$

إجابة رنا
$$c_{23}=-8-18+20$$
 $=-6$

إجابة عبير
$$c_{23}^{}=12-8-18 = -14$$

أَيُّهما إجابتها صحيحة؟ أُبرِّر إجابتي.

$$(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$
 تبریر: إذا کان $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ تبریر: إذا کان

AB = BA مسألة مفتوحة: أكتب المصفو فتين A, B غير الصفريتين، بحيث يكون


: تحدِّ: أجد قيمة كلِّ من e,f,g,h التي تجعل المعادلة الآتية صحيحة 34

$$\left[\begin{array}{cc} 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{array}\right] \times \left[\begin{array}{cc} e & f \\ g & h \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc} 1 & 12 \\ 6 & 15 \end{array}\right]$$



المُحدِّدات وقاعدة كرىمر

المُحدِّدات



|A| الْمَحَدُدة للمصفوفة الْمُربَّعة A هي عدد حقيقي يرتبط بالمصفوفة A ، ويُرمَز إليه بالرمز يُطلَق على مجموعة العناصر المُمتدَّة من الزاوية اليسرى العلوية إلى الزاوية اليمني السفلية في المصفوفة اسم القُطْر الرئيس للمصفوفة

للقُطْر الرئيس دور أساسي في إيجاد مُحدِّدة مصفوفة من الرتبة 2 imes 2 . وفي ما يأتي طريقة إيجاد مُحدِّدة المصفوفة ذات الرتبة اً و ما يُسمّى مُحدّدة الدرجة الثانية 2 imes 2

مُحدِّدة الدرجة الثانية

مفهوم أساسي

بالكلمات: يُرمَز إلى مُحدِّدة المصفوفة: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ بالرمز $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، وتساوي قيمتها ناتج ضرب عنصري القُطْر الرئيس مطروحًا منه ناتج ضرب عنصري القُطْر الآخر.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$
 بالرموز:



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

مثال 1 أجد قيمة كلِّ من المُحدِّدات الآتية:

 $\begin{vmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} -2 & 7 \\ -1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 20 \\ 2 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 3788897923



$$\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$





$$\begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

يُطلَق على مُحدِّدة المصفوفة ذات الرتبة 3 × 3 اسم مُحدِّدة الدرجة الثالثة ويُمكِن حساب قيمتها بتوظيف مُحدِّدة الدرجة الثانية كما هو مُبيَّن أدناه.

مُحدِّدة الدرجة الثالثة

مفهوم أساسي

يُمكِن إيجاد مُحدِّدة المصفوفة:
$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$
باستعمال الطريقتين الآتيتين:

الطريقة 1: باستعمال قاعدة الأقطار.

الخطوة 1: أُعيد كتابة العمود الأوَّل والعمود الثاني على يمين المُحدِّدة.

الخطوة 2: أجد ناتج ضرب عناصر القُطْر الرئيس، وثلاثيات

العناصر على المُوازِيات الحمراء المُبيَّنة، ثمَّ أجد مجموعها

الكلي.

الخطوة 3: أجد ناتج ضرب عناصر القُطْر الآخر، وثلاثيات العناصر على المُوازيات الزرقاء المُبيَّنة، ثمَّ أجد مجموعها

الكلي.

الخطوة 4: أجد قيمة المُحدِّدة بطرح ناتج الخطوة 3 من ناتج الخطوة 2.

 2×2 الطريقة 2: باستعمال مُحدِّدة المصفوفة

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923

مثال 2

$$2 imes 2 imes 2$$
 باستعمال قاعدة الأقطار، ثمَّ باستعمال مُحدِّدة المصفوفة $2 imes 2$. أجد قيمة $2 imes 1$ المصفوفة $2 imes 2 imes 1$. $1 imes 6 imes 3$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923

مثال 3


أجد قيمة كلِّ من المُحدِّدات الآتية باستعمال قاعدة الأقطار، ثمَّ باستعمال مُحدِّدة المصفوفة 2 × 2:

$$\begin{array}{c|cccc}
0 & -3 & 1 \\
5 & 8 & -2 \\
4 & 7 & 3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
 & -4 & 3 & 2 \\
 & 6 & 5 & 1 \\
 & -4 & 3 & 2
\end{array}$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923



$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 4 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

مثال 4

2 imes 2 أجد قيمة كل مُحدِّدة ممّا يأتي باستعمال قاعدة الأقطار، ثمَّ باستعمال مُحدِّدة المصفوفة

a)
$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 9 \\ -2 & 3 & 4 \\ -5 & 7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{c|cccc} \mathbf{b}) & \begin{array}{c|cccc} 0 & -5 & -1 \\ 4 & 1 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array} \end{array}$$

إعداد المعلم؛ أحمد ابراهيم المصري

حساب مساحة المُثلَّث باستعمال المُحدِّدات

يُمكن حساب مساحة مُثلَّث عُلمت إحداثيات رؤوسه في المستوى الإحداثي باستعمال القاعدة الآتية.

مفهوم أساسي مساحة مُثلَّث مرسوم في المستوى الإحداثي باستعمال المُحدِّدات

مساحة المُثلَّث الذي إحداثيات رؤوسه: $X(x_1, y_1), Y(x_2, y_2), Z(x_3, y_3)$ ، هي نصف القيمة المُطلَقة للعدد A، حيث:


$$A = \left| \begin{array}{ccc} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{array} \right|$$

تستعمَل القيمة المُطلَقة للعدد A ؛ لأنَّ المساحة لا تكون سالبة.



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

مثال 5




يظهر في المستوى الإحداثي المجاور مُخطَّط لجزيرة على شكل مُثلَّث.

إذا كانت كل وحدة في المستوى الإحداثي ثمثّل 1 km ، فأجد مساحة الجزيرة.

إعداد المملم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

مثال 6


يظهر في المستوى الإحداثي المجاور إحداثيات كلِّ من مدينة الزرقاء، ومدينة الرمثا، ومدينة المفرق. إذا كانت كل وحدة في المستوى الإحداثي ثمثّل 10 km ، فأجد مساحة المنطقة التي رؤوسها هذه المدن الثلاث.



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 3788897923

مثال 7

أجد مساحة المُثلَّث ABC المرسوم في المستوى الإحداثي أدناه.





إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923

مثال 8

خرائط: يقع منزل خولة عند النقطة B(3,5) على خريطة إحداثية للمدينة، ويقع منزل فدوى عند النقطة C(7,0) على خريطة أحداثية للمدينة، ويقع منزل فدوى عند النقطة D(5,9). أجد مساحة المُثلَّث BCD، علمًا بأنَّ الوحدة الواحدة على الخريطة تُمثِّل 20 m على الأرض.

0788897923

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى

حلُّ أنظمة المعادلات والمُحدِّدات

يُمكِن استعمال المُحدِّدات لحلِّ أنظمة معادلات خطِّية بمُتغيِّرين، كلُّ منها مكتوب في صورة: يُمكِن استعمال المُحدِّدات لحلِّ أنشِئ أوَّلاً مصفوفة عناصرها معاملات المُتغيِّرين x وy, وهي تُسمّى مصفوفة المعاملات المُتغيِّرين x والمعاملات (coefficient matrix)، ثمَّ أحسُب مُحدِّدتها؛ فإذا كانت المُحدِّدة لا تساوي صفرًا، فإنَّا ألَّا يكون للنظام صفرًا، فإنَّا ألَّا يكون للنظام حلُّ، وإمّا أنْ يكون له عدد لانهائي من الحلول. وفي حال لم تكن قيمة مُحدِّدة مصفوفة المعاملات صفرًا، فيُمكِن استعمال قاعدة كريمر (Cramer's rule) لإيجاد حلِّ النظام كما هو مُبيَّن أدناه.

قاعدة كريمر

مفهوم أساسى

$$(a_1 x + b_1 y = c_1 : a_2 x + b_2 y = c_2)$$
 جونان: $C = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ عصفوفة المعاملات للنظام: $C = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ عصفوفة المعاملات للنظام هو: $D \neq 0$ حيث $D = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ عربان: $D = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ عربان: $D = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ عربان: $D = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{bmatrix}$ عربان: $D = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{bmatrix}$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923

مثال 9

أَخُلُ نظام المعادلات الآتي باستعمال قاعدة كريمر (إنْ أمكن)

$$3x + 5y = 1$$

$$2x + y = -4$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

مثال 10 أُخُلُ نظام المعادلات الآتي باستعمال قاعدة كريمر (إنْ أمكن)



$$-2x+7y=12$$

$$x + y = 3$$

$$4x - 3y = 29$$

$$2y + 5x = -5$$



$$x + 5y = -17$$

$$3x - 4y = 6$$



$$2x - 3y = 29$$

$$6y - 4x = 12$$



$$5x - 4y = 22$$

$$4x + 3y = -1$$



$$6x - 7y = -11$$

$$5x + 4y = 40$$



إعداد المملم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

ما قيمة $\,c\,$ التي تجعل مُحدُّدة مصفوفة المعاملات للنظام الأتي تساوي صفرا

مثال 11

$$2x + y = 6$$

$$cy = 3 - x$$

مثال 12



يُطلَق اسم المُثلَّث الذهبي على واحدة من أهم الوِجهات السياحية في جنوب الأردن، وهي المنطقة التي تضمُّ مدينة العقبة ومدينة البترا ووادي رم. إذا كانت إحداثيات المناطق الشلاث على خريطة للمملكة في مستوى إحداثي، وحدته 1 km ، هي: (0,0) للعقبة، و(56,116) للبترا، و(6,50)

لوادي رم، فأستعمل المُحدِّدات لحساب مساحة المُثلَّث الذي رؤوسه هذه المواقع الثلاثة.



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

مهارات التفكير العليا 🔈

أُولًا: أَكْتَبِ مَصِفُوفَة مُربَّعَة مِن الرِتَبَة 2 × 2 تُحقَّق الشَّرِط المُعطى في كلِّ مِمَا يأتي:

مُحدِّدتها تساوي صفرًا.

-1مُحدِّدتها تساوي

-12 جميع عناصرها أعداد موجبة، ومُحدُدتها



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

ثانیًا:

تحد. عند حل نظام من معادلتين بمتغيرين باستعمال قاعدة كريمر، فإن الحل هو:

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & a \\ b & c \end{vmatrix}}{5}$$
, $x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{5}$

c = b و a و b ما قيمة كل من

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 3788897923

الدرس الخامس: النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة حل المعادلات الخطية

مصفوفة الوحدة، ونظير المصفوفة الضربي

x(1) = 1(x) = x أَنَّ ناتج ضرب أيِّ عدد حقيقي في العدد 1 هو العدد نفسه؛ إذ إنَّ ناتج ضرب أيِّ عدد حقيقي x. لذلك يُسمِّى العدد 1 عنصرًا مُحايدًا لعملية ضرب الأعداد الحقيقية.

$$I = \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right.$$

كذلك توجد مصفوفة مُربَّعة تُسـمّى مصفوفة الوحدة (identity matrix)، ويُرمَـز إليها بالرمز I، ويكون جميع عناصر قُطْرها الرئيس I، وتكون بقيَّة عناصرها أصفارًا، وتمتاز بخاصية في ضرب المصفوفات تُشبِه خاصية العدد I في ضرب الأعداد الحقيقية.

يُمكِن التحقُّق من أنَّ ناتج ضرب المصفوفة I في أيِّ مصفوفة مُربَّعة A، لها نفس رتبة I، هو المصفوفة A نفسها؛ أيْ إنَّ:

$$I \times A = A \times I = A$$

أتعلَّم

- مصفوفة الوحدة من الرتبة 2 × 2 هي:
 - $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- مصفوفة الوحدة من الرتبة 3 × 3 هي:

$$\left[\begin{array}{ccc}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{array}\right]$$

المصفوفة المُحايدة لعملية ضرب المصفوفات

مفهوم أساسي

بالكلمات: مصفوفة الوحدة I هي المصفوفة المُحايِدة لعملية ضرب المصفوفات، التي إذا ضُرِبت في أيِّ مصفوفة أُخرى من الرتبة نفسها كان ناتج الضرب هو المصفوفة الأُخرى نفسها.

بالرموز: لأيِّ مصفوفة مُربَّعة A، لها رتبة المصفوفة المُحايدة I نفسها، فإنَّ:

$$I \times A = A \times I = A$$

إذا كانت المصفوفة A, B مُربَّعتين من الرتبة نفسها، وكان: $A \times B = B \times A = I$ ، فإنَّ المصفوفة A مُربَّعتين من الرتبة نفسها، وكان: $A \times B = B \times A = I$ ، وتُسمّى المصفوفة A تُسمّى نظيرًا ضربيًّا للمصفوفة A المصفوفة A أيضًا نظرًا ضربيًّا للمصفوفة A.

أتعلَّم

إذا كان A, B مصفوفتين من الرتبة نفسها، مُربَّعتين من الرتبة نفسها، وكان AB = I، فيانً BA = I.

النظير الضربي للمصفوفة المُربَّعة

مفهوم أساسي

النظير الضربي للمصفوفة المُربَّعة A هو المصفوفة A^{-1} ، حيث:

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$$

A^{-1} هــو رمــز للنظيــر الضربــي للمصفوفة A، وليس $\frac{1}{A}$.

أتعلَّم



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

ا أبيَن في كل مما يأتي إذا كانت كل مصفوفة تمثل نظيرًا ضربيًا للمصفوفة الأخرى:

مثال 1

$$\begin{array}{c}
 \bullet \\
 A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$G^{02}F = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$
, $G = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$$
, $D = \begin{bmatrix} 2.5 & 1.5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$



إعداد المملم: أحمد ابراهيم المصري - 88897923



$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$



$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$



$$L = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$



$$G = \begin{bmatrix} -3 & -11 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 1.5 & 5.5 \\ -0.5 & -1.5 \end{bmatrix}$$

2 imes 2 إيجاد النظير الضربي لمصفوفة غير مُنفردة من الرتبة

إذا كانت مُحدِّدة المصفوفة تساوي صفرًا، فلا نظيرَ ضربيًّا لها، وتُسمّى عندئذٍ مصفوفة مُنفرِدة (singular matrix). أمّا المصفوفة التي مُحدِّدتها لا تساوي صفرًا، فإنَّ لها نظيرًا ضربيًّا، وتُسمّى عندئذٍ مصفوفة غير مُنفرِدة (non-singular matrix). يُمكِن إيجاد النظير الضربي لمصفوفة غير مُنفرِدة من الرتبة 2 × 2، إذا كانت مُحدِّدتها لا تساوي صفرًا كما هو مُبيَّن أدناه.

2 imes 2 النظير الضربى لمصفوفة غير مُنفردة من الرتبة

مفهوم أساسي

بالكلمات: إذا كانت مُحدِّدة المصفوفة A ذات الرتبة 2×2 لا تساوي صفرًا، فإنَّ لها نظيرًا ضربيًّا يُمكِن إيجاده باتِّباع الخطوات الآتية:

- 1 تبديل موقع كلِّ من عنصري القُطْر الرئيس.
 - 2 ضرب عنصري القُطْر الآخر في 1-
- ق ضرب المصفوفة الناتجة في مقلوب المُحدِّدة، أو $\left(\frac{1}{|A|}\right)$.

 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$: هو: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ هو: النظير الضربي للمصفوفة: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ c & d \end{bmatrix}$ هو: المصفوفة: ال

ا أبيِّن إذا كانت كل مصفوفة ممًا يأتي مُنفرِدة أو غير مُنفرِدة، ثمَّ أجد النظير الضربي للمصفوفة غير المُنفرِدة:

مثال 2



$$M = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$$



$$F = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 788897923



$$H = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$



$$J = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



$$K = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ -8 & -7 \end{bmatrix}$$

المعادلات المصفوفية

المعادلة المصفوفية (matrix equation) هي معادلة تتضمَّن مصفوفات مجهولة (أو تكون . بعض عناصرها مجهولة)، ومصفوفات معلومة، إضافةً إلى عمليات على تلك المصفوفات. معناصرها مجهولة: ax = b فتُشبه طريقة حلِّ المعادلة: ax = b حيث أمّا طريقة حلِّ المعادلة المصفوفية:

معادلة مصفو فية

AX = B $A^{-1}(AX) = A^{-1} \times B$ $A^{-1}(AX) = A^{-1}(AX) = A^{-1}(AX)$ $A^{-1}(AX) = A^{-1}(AX) = A^{-1}(AX)$ $A^{-1}(AX) = A^{-1}(AX)$ A^{-1}

معادلة جبرية

. أعداد حقيقية كما هو مُبيَّن أدناه a, b, x

$$ax = b$$
 $\frac{1}{a}(ax) = \frac{1}{a}(b)$
 $\frac{1}{a}(ax) = \frac{1}{a}(b)$
 $\frac{1}{a}$
 $\frac{1}{a}$

لحلِّ نظام مـن معادلتين خطِّيتين بمُتغيِّريـن، أُحوِّلهما أوَّلًا إلى معادلـة مصفوفية صورتها: AX = B مصفوفة معامـلات المُتغيِّرين، وX مصفوفة المُتغيِّرات في المعادلتين الخطِّيتيـن، وX مصفوفة الثوابت، فيكون حلُّ هذا النظام هو : $X = A^{-1}$ شـرط أنْ تكون المصفوفة X غير مُنفرِدة.



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (788897923

أَحُلُ نظام المعادلات الآتي باستعمال النظير الضربي (إنْ أمكن):

$$5x + 3y = 3$$

$$x - 2y = 11$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

مثال 4

أَخُلُ نظام المعادلات الآتي باستعمال النظير الضربي (إنْ أمكن):

$$3x - y = 13$$

$$3y - 2x = 4$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

مثال 5 من الحياة

كيمياء: يعمل يوسف في أحد مختبرات البحوث، وهو يريد تحضير 100 من محلول حمض الهيدروكلوريك (HCL) بحيث تكون نسبة تركيزه %35 إذا علمْتُ أنَّ المختبر يحوي من هذا الحمض محلولًا نسبة تركيزه %15 ، ومحلولًا آخر نسبة تركيزه 40% ، فكم لترًا سيستعمل يوسف من كلا المحلولين؟

أكتب معادلة مصفوفية ثمثّل المسألة، ثمَّ أحُلُها.



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923

مثال 6

طهي: يوجد في معمل للحلويات محلولان، تركيز السُّكَّر في أحدهما 12%، وتركيزه في الآخر 20 L من 12%، وتركيزه في الآخر 30%. يريد الطاهي تحضير 20 L من محلول، تركيز السُّكَّر فيه %15. كم لترًا سيستعمل الطاهي من كلا المحلولين المُتوافِرين في المعمل؟ أكتب معادلة مصفوفية تُمثِّل المسألة، ثمَّ أحُلُّها.



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى



أبِيِّن إذا كانت كلِّ من المصفوفات الآتية مُنفردة أو غير مُنفردة، ثمَّ أجد النظير الضربي لغير المُنفردة منها:

$$\begin{array}{cc}
5 & P = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}
\end{array}$$

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc}
7 & S = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}
\end{array}$$

$$8 V = \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

أَحُلُ كُلًا من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال النظير الضربي (إنْ أمكن)

$$3x + 5y = 13$$
$$x - 2y = -3$$


$$\begin{array}{c}
-2x + 4y = 6 \\
x + 2y = 7
\end{array}$$


$$5x - 8y = 31$$
$$2y - 3x = -13$$

$$x + y = 20$$
$$x - 2y = -1$$

$$3x + 2y = 8$$
$$x = y + 1$$

$$2x + 7y = 24
 4x + 13y = 46$$





الصف الثاني ثانوي أكاديمي – رياضيات الأعمال

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (788897923

15 صيدلة: لدى صيدلي محلولان، تركيز الملح في أحدهما 2%، وتركيزه في الآخر 12%. يريد الصيدلي تحضير 15 من محلول، تركيز الملح فيه 10%. ما المعادلة المصفوفية التي يتعيَّن استعمالها لتحضير الكمية المطلوبة من المحلول؟ أكتب معادلة مصفوفية تُمثِّل المسألة، ثمَّ أحُلُّها.

الصف الثاني ثانوي أكاديمي – رياضيات الأعمال

إعداد المملم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

أوراق نقدية: مع سعاد مجموعة من الأوراق النقدية من فئة 10 JD، وفئة 20 JD، وفئة 20 JD، وفئة 20 تبلغ قيمتها الإجمالية JD 750. إذا علمْتُ أنَّ عدد أوراق فئة العشرين دينارًا يقلُّ عن مثلي عدد أوراق فئة عشرة الدنانير بمقدار 5 أوراق، فأكتب معادلة مصفوفية تُمثِّل المسألة، ثمَّ أحُلُّها لإيجاد عدد أوراق النقد التي مع سعاد من كلتا الفئتين.



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (0788897923

ردة? ما قيمة x التي تجعل المصفوفة: $\begin{bmatrix} 5 & x \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ مُنفرِدة?

انظيرًا ضربيًّا لنفسها?
$$egin{bmatrix} a & 0 \ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
 انظيرًا ضربيًّا لنفسها? المصفوفة: a

$$(B+C)^{-1}=A$$
 : يكون $A=\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ إذا كان $B=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ إذا كان

$$A^3=A-6I$$
 إذا كان A مصفوفة من الرتبة $2 imes 2$ ، حيث: $A=2A-3I$ ، فأُثبِت أنَّ



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 3788897923

21

مسألة اليوم استأجر مُنظِّمو رحلة بحرية في خليج العقبة 8 قوارب، بعضها يحمل 4 أشخاص، وبعضها الآخر يحمل 7 أشخاص. إذا كان عدد المشاركين في الرحلة 50 شخصًا، فأستعمل معادلة مصفوفية لإيجاد عدد القوارب المُستأجَرة من كل نوع.



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

مهارات التفكير العليا 🦠



راک العدیر العدیا
$$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$
: تبریسر: إذا کان: $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، وکانت: $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، فهل تو جد عناصر سالبة في $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. أُبرِّر إجابتي.

$$.(AB)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$$
 : $\ddot{\hat{b}}$ نَشِت أَنَّ $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ و کان: $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ و کان: $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ برهان: إذا كان:



24 أكتشف المختلف: أيُّ المصفوفات الآتية مختلفة؟ أُبرِّر إجابتي.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$.BA^2=A$$
 : قان: إذا كان: $A=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ ، فأجد المصفو فة B التي تُحقِّق المعادلة: $A=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (788897923

كتاب التمارين

مُقدِّمة في المصفوفات Introduction to Matrices

الدرس

أُحدِّد رتبة كل مصفوفة ممّا يأتي:

$$\begin{bmatrix} -8 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

 $\begin{bmatrix}
0 & 4 & -1 \\
5 & -3 & 6
\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}
5 & 8 & 2 \\
-4 & 0 & 3 \\
7 & 6 & 5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 & 0 \\ 5 & -2 & 1 \\ 3 & 8 & -2 \\ 1 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

المشروب	صغير	وسط	كبير
غازيٌ	40	60	75
شاي	30	40	55
قهوة	50	70	90
عصير	65	90	125

يُبيِّن الجدول المجاور الأسعار (بالقروش) لعدد من المشروبات في أحد المَحالِ التجارية:

- رُّرِّب هذه البيانات في مصفوفة رتبتها 3imes 4، ثمَّ أُسمّي المصفوفة P.
 - اً أَجِد العنصر p_{32} ، ثمَّ أُبيِّن ما يُمثِّله.
 - 9 ما رمز العنصر 55 في هذه المصفوفة؟

$$[x,y] . [x,y] . [x,$$

	المدارس	المراكز الصِّحِّية
المحافظة 1	54	12
المحافظة 2	94	23
المحافظة 3	75	18

خدمات حكومية: يُتوقَّع إنشاء مدارس ومراكز صِحِّية جديدة عام 2025م وعام 2026م في ثلاث محافظات كما هو مُبيَّن في الجدول المجاور:

- الله أُرتِّب هذه البيانات في مصفوفة رتبتها 3×2
- (1) أجد مجموع عناصر الصف الأوَّل، ثمَّ أُبيِّن ما يُمثِّله هذا المجموع (إنْ كان له معنى).
- (13 أجد مجموع عناصر العمود الثاني، ثمَّ أُبيِّن ما يُمثِّله هذا المجموع (إنْ كان له معني).

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى

العمليات على المصفوفات Operations on Matrices

الدرس

2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ -3 & 1 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 8 \\ 1 & 5 & 4 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} -9 & 30 & 36 \\ 12 & 15 & -24 \end{bmatrix}$$
 إذا كان:

$$\bigcirc$$
 $A + B$

$$2B+C$$

$$\bigcirc$$
 $C-D$

$$A B - A$$

$$\bigcirc$$
 3A – 2B

$$D + 2C$$

$$8 - \frac{2}{3}D$$

وي أكتب المصفوفة:
$$A = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{7}{6} \end{bmatrix}$$
 غي صورة: $A = kM$ ، حيث A عدد ثابت، و M مصفوفة عناصرها أعداد صحيحة.

$$[a, c] \cdot [a, c] \cdot$$

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري



$$(y, x)$$
 يَأْجِدُ قَيْمَةُ كُلِّ مِن (x, y) (y, x) (y, x)

$$B$$
 إذا كانت: $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} - 2B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ ، فأجد المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

أجد قيمة كلِّ من x، وy التي تُحقِّق المعادلة الآتية:

$$x[0 \ 1 \ 3] + y[0 \ 0 \ 5] = [0 \ (3-y) \ -7]$$

طرازات أجهزة التكييف المنزلي عدد ما أنتجته 3 مصانع لإحدى الشركات من 3 طرازات لأجهزة التكييف المنزلي في النصف الثاني في النصف الأوَّل من عام 2020م، ويُبيِّن الجدول الأيمن عدد أجهزة التكييف المنزلي المُنتَجة في النصف الثاني من العام نفسه في هذه المصانع. أكتب مصفوفة تُمثِّل عدد ما أنتجه كل واحد من هذه المصانع الثلاثة من طرازات أجهزة التكييف المنزلي عام 2020م.

	A الطراز	B الطراز	Cالطراز
المصنع 1	700	1300	670
المصنع 2	650	1000	890
المصنع 3	480	900	540

	A الطراز	B الطراز	الطراز C
المصنع 1	850	1200	670
المصنع 2	540	860	530
المصنع 3	620	750	490



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

ی

ضرب المصفوفات Matrix Multiplication

الدرس

3

إذا كانت $A_{5 imes 3}$ ، وكانت $B_{2 imes 3}$ ، وكانت $A_{5 imes 3}$ ، فأُحدِّد عمليات الضرب المُمكِنة ممّا يأتي، ثمَّ أجد رتبة المصفوفة الناتجة:

- \bigcirc AB
- \bigcirc AC
- 3 CA
- \bigcirc BC
- 5 CB

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 3 & -2 \\ -4 & 1 & 7 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -4 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$
 إذا كان:

6 AB

 \bigcirc BA

8 BC

9 *CB*

10 BD

11) 2A + 3BC

12 A^2

13 A^3

 $(CB)^2$

$$y$$
 ، y ، y ، y ، y ، y ، y . y

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$
 أجد ناتج: 16

$$B^3$$
 إذا كان: $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \sqrt{3} & -1 \end{bmatrix}$ إذا كان:

$$A+C=BC$$
 إذا كان: $A=\begin{bmatrix} 6\\18 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 3&4\\2&-1 \end{bmatrix}$ إذا كان: $B=\begin{bmatrix} 3&4\\2&-1 \end{bmatrix}$



إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري (788897923

يتبع	ضرب المصفوفات	الكراس
	Matrix Multiplication	

مبيعات: يُبيِّن الجدول الأيمن قيمة مبيعات أحذية الرجال والنساء والأطفال (بالدنانير) لثلاثة مندوبي مبيعات، ويُبيِّن الجدول الأيسر نسب العمولة القديمة والجديدة للمبيعات. أُجيب عن السؤالين التاليين اعتمادًا على المعلومات الواردة في هذين الجدولين:

	النسبة	النسبة
	القديمة	الجديدة
أحذية الرجال	9%	9.5%
أحذية النساء	9%	10%
أحذية الأطفال	13%	12%

	أحذية الرجال	أحذية النساء	أحذية الأطفال
المندوب 1	1200	2300	900
المندوب 2	3100	2800	1100
المندوب 3	3700	2600	800

- آجد المصفوفة التي تُمثّل ما يجنيه كلٌّ من المندوبين الثلاثة وَفق النسبة الجديدة والنسبة القديمة.
 - 20 أُحدِّد المندوب الأكثر استفادة من تغيير نسب العمولة، ثمَّ أُبرِّر إجابتي.

أُحدِّد إذا كانت كل عبارة ممّا يأتي صحيحة أحيانًا، أو صحيحة دائمًا، أو غير صحيحة أبدًا، ثمَّ أُبرِّر إجابتي:

- اذا أمكن إيجاد AB و BA فإنَّ المصفوفة A والمصفوفة B مُربَّعتان.
- إذا كان AB مصفوفة صفرية، فإنَّ A مصفوفة صفرية، أو B مصفوفة صفرية. $oxed{2}$

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري 0788897923

المُحدِّدات وقاعدة كريمر Determinants and Cramer's Rule

الدرس

4

أجد قيمة كلِّ من المُحدِّدات الآتية:

$$\begin{array}{c|cc}
 & 5 & 3 \\
 & -2 & 1
\end{array}$$

$$\begin{vmatrix} -5 & 10 \\ -3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & -3 & 1 \\ 8 & 0 & 4 \\ 2 & -5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
 & 4 & -2 & -4 \\
 & -6 & 3 & 6 \\
 & -1 & 0 & -2
\end{array}$$

$$.|BA|$$
 ا ا ا ا AB ا ا ا AB ا ا ا ا ا AB ا ا ا AB ا ا ا AB ا ا AB ا ا ا AB ا ا AB ا ا AB ا ا AB

$$x$$
 افا الحادث: 9 = 9 الحد قيمة $\begin{bmatrix} x & 8 \\ 2 & x \end{bmatrix}$ افأجد قيمة $\begin{bmatrix} 8 \end{bmatrix}$

$$A$$
. فأجد مُحدِّدة A : وأُبِيِّن علاقتها بمُحدِّدة A : وأُبِيِّن علاقتها بمُحدِّدة A : وإذا كان: A

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$
 : أستعمل هذه القاعدة لإيجاد القاعدة المستقيم المارِّ بالنقطتين $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ بالقاعدة $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ معادلة المستقيم المارِّ بالنقطتين $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$.

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

المُحدِّدات وقاعدة كريمر Determinants and Cramer's Rule

الدرس

4

أحُلُّ كُلًّا من أنظمة المعادلات الآتية باستخدام قاعدة كريمر:

$$3x - 5y = 22$$
$$2x + y = 6$$

$$3y + 5x = 7$$
$$2x - 4y = 8$$

$$3x = y + 10$$
$$4y = 6 + 5x$$

- . أجد مساحة المُثلَّث الذي رؤوسه: A(-2,5), B(7,11), C(1,15) باستعمال المُحدِّدات.
- 16 نقود: يوجد في صندوق مُحاسِب 75 ورقة نقد أردنية من فئة الدينار وخمسة الدنانير وعشرة الدنانير، تبلغ قيمتها الإجمالية JD 460. إذا كان عدد أوراق النقد من فئة خمسة الدنانير يساوي 4 أمثال عدد أوراق النقد من فئة الدينار، فأجد عدد ما في الصندوق من أوراق النقد لكل فئة باستعمال قاعدة كريمر.

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصري

النظير الضربب للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطِّية

الدرس

5

Inverse Matrix and Systems of Linear Equations

أُبيِّن إذا كانت كل مصفوفتين ممّا يأتي تُمثِّل إحداهما نظيرًا ضربيًّا للأُخرى:

$$F = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 0.25 & -0.25 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

أُبيِّن إذا كانت كلٌّ من المصفوفات الآتية مُنفرِدة أو غير مُنفرِدة، ثمَّ أجد النظير الضربي لغير المُنفرِدة منها:

$$M = \begin{bmatrix} 4 & -10 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{5} & R = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}
\end{array}$$

أُحُلُّ أنظمة المعادلات الآتية باستخدام النظير الضربي:

$$\begin{array}{c}
-2x + y = 13 \\
x - 2y = -11
\end{array}$$

$$4x + 5y = 22$$
$$3x + 4y = 17$$

$$3x - 8y = 34$$
$$2y - 4x - 28 = 0$$

و أجد قيمة
$$x$$
 التي تجعل المصفوفة: $\begin{bmatrix} x & 1 \\ 15 & x+2 \end{bmatrix}$ مُنفرِدة.

$$|A^{-1}|$$
 و $|A^{-1}|$ و $|A^{-1}|$ إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

بتبع

0788897923

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى

الدرس

النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطِّية

5

Inverse Matrix and Systems of Linear Equations

إذا كان A و B مصفو فتين مُربَّعتين من الرتبة 2×2 ، و كان: $AB = B^5$ ، و كان: $AB = B^6$ ، حيث I المصفو فة المُحايِدة، B(AB) = A: فأُثبت أنَّ: B(AB) = A:

Bا إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ، وكان A مصفوفة مُربَّعة من الرتبة 2×2 ، حيث: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ إذا كان:

 $B+B^{-1}=I$ إذا كان: $B=\begin{bmatrix} 2 & a \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ بيث $A\neq 2$ ميث $B=\begin{bmatrix} 2 & a \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

تغذية: تُخطِّ ط اختصاصية تغذية نظامًا غذائيًّا للاعب كرة قدم، بحيث يتيح له استهلاك 3600 سعرة حرارية يوميًّا؛ بأنْ يأكل g 750 من البروتينات والكربوهيدرات والدهون كل يوم. إذا كان الغرام الواحد لحكِّ من البروتينات والكربوهيدرات يُزوِّد الجسم بنحو 4 سعرات، وكان الغرام الواحد من الدهون يُروِّد الجسم بنحو 9 سعرات، وبلغت نسبة السعرات المُقرَّرة التي مصدرها البروتينات والدهون يحو 60%؛ فأكتب معادلة مصفوفية، ثمَّ أُخلُّها لإيجاد مقدار ما يتناوله هذا اللاعب من البروتينات والكربوهيدرات والدهون يوميًّا.

إعداد المعلم: أحمد ابراهيم المصرى

أسئلة الوحدة

اختبار نهاية الوحدة

: يساوي:
$$A = \begin{bmatrix} 15 & -8 & 0 \\ 9 & 22 & -4 \\ -3 & 6 & 12 \end{bmatrix}$$
 يساوي: 1

- **a)** 15
- **b)** -12
- **c**) 5
- **d)** -2

ق إذا كانت
$$A_{3\times 2}$$
، وكانت $B_{2\times 4}$ ، وكانت $A_{3\times 2}$ ، فإنَّ العملية التي يُمكِن إيجادها هي:

- a) A+B
- b) B+C
- c) 5B 3C d) (A+C)B

$$\begin{bmatrix} 4 & x \\ 7 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - y & 2 \\ 4 & z \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & x - z \end{bmatrix}$$
: إذا كانـــت $(x + y + z)$ تساوى:

- a) 10
- **b)** 19
- c) 21
- d) 26
- $C = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ -4 & 1 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ مصفوفة مُنفرِدة، فالله قيمة x قيمة x ممّا يأتي $C = \begin{bmatrix} -8 & x \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ مصفوفة مُنفرِدة، فالله ممّا يأتي تساوى:
- **b)** -12
- c) 6
- $\frac{d}{}$ -26

- قيمة $C = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & -3 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 9 & -2 & -3 \end{bmatrix}$: العنصر C_{23} تساوي: $a_{21} + a_{32}$ يساوي: $a_{21} + a_{32}$ يساوي: $a_{21} + a_{32}$ 1

- c) 25
- **d)** 27
- إذا كانت $L_{3\times4}$ ، وكانت $M_{5\times3}$ ، وكانت $L_{3\times4}$ ، فإنَّ رتبة المصفو فة T، حيث: T = NML، هي:
- a) 2×3
- b) 3×5
- c) 3×4
- d) 2×4

اذا كان:
$$A = \begin{bmatrix} a-3 & -2 \\ 2 & a+2 \end{bmatrix}$$
 عدد ثابت، فأُجيب عن

الأسئلة الثلاثة الآتية تباعًا:


- a أجد مُحدِّدة A بدلالة \overline{a}
- أجد قِيَم a التي تجعل المصفوفة A مُنفردة. a
 - a = 3 أجد A^{-1} عندما
 - $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & 4 \end{bmatrix}$ يَوْا كَانِ:
- 10 C(B+D)
- 11 AB


B+C

13 2B - 3C

(انْ أمكن):

اختبار نهاية الوحدة





15 يُبيِّن الجدول التالي توزيع سُكَّان إحدى البلدات (بالآلاف) بحسب فئات العمر والجنس. أُنظِّم هذه البيانات في مصفوفة صفوفها فئات الأعمار، ثمَّ أُحدِّد رتبتها.

العمر	الذكور	الإناث
0 - 19	71	66
20 - 39	68	59
40 - 59	32	22
60 فأكثر	11	14


إذا كان:
$$A = \begin{bmatrix} x & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$
 التي 16 $AB = BA$

$$k$$
 إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ إذا كان: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ إذا كان: والثابت A اللذينِ يجعلان A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$
: فأجد BA $= 2C^2$

$$.2X - \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$
: المعادلة: 19

20 أجد مساحة المُثلَّث الآتي باستعمال المُحدِّدات.



21 أُحُلُّ نظام المعادلات الآتي باستعمال قاعدة كريمر:

$$3x - 2y = 8$$
$$5x + 3y = 13$$

22 أُحُلُّ نظام المعادلات الآتي باستعمال النظير الضربي:


$$x - 5y = 14$$
$$3x - 8y = 28$$

ريت
$$a$$
 عدد ثابت $B=\begin{bmatrix}2&a\\-1&-1\end{bmatrix}$ إذا كان:

a نام قدمة $B + B^{-1} = I$ ، ناجد قدمة کان کان الم

24 كيمياء: لدى عائشة 3 محاليل حمضية، تركيز الحمض في المحلول الأوَّل 10%، وتركيزه في المحلول الثانسي %20، وتركيزه في المحلول الثالث %40. أكتب معادلة مصفوفية تُمثِّل المسألة، ثمَّ أُحُلُّها لإيجاد الكميات التي يتعيَّن على عائشة مزجها من المحاليل الثلاثة للحصول على ML من محلول حمضي نسبة تركيزه %18، علمًا بأنَّ الكمية التي ستُستعمَل من المحلول الذي تركيزه 10% تساوى أربعة أمثال ما سيستعمَل من المحلول الذي تركيزه %40.





انضمّ إلى أكثر من 197 ألف متابع على قناتنا على اليوتيوب ،



تابع معنا على مجموعة الفيسبوك الرياضيات مع الأستاذ أحمد المصري

لدخول مجموعات الدّراسة أو لطلب البطاقة عبر واتساب (0785922035